

1

Alólírottak hitelesen bizonyítják, hogy Kárpáthely határa belülről
gelőnek megkeményedésére és becsültségére változott becsület, név
szerint az Ország részét Lengyel Sándor 43. éves Thom. Catholicus
Marcellói inkler, - a közép részét János János Csóthi la.
48. éves Thom. Catholicus földművelő, - a birodalom részét,
Oláh János 58. éves Thom. Catholicus papai talos az alispánys
bizottság előtt megpírtetve, körbejöttükkel az illető leg
előre néve, követendő becsülettel:

1. A Kárpáti erdőnek azon része, mely a Noráji
határtól kezdve, a Dalás határ között a széles erdő ho-
zát tartja, - róma, apró bűnyével becsült, kevesebb képlato
füvet termő ritka halozatú gyepesedő, s mint ilyen roszan
vörös homokkal vegyült kavicsos talajánál fogva 3. osztályú
szántóföldnek becsülendő.

2. A Kárpáti erdőnek azon része pedig, mely az 1. p. a. ho-
zát tartja és a Homokoséri dűlő között terjed, széles rosz
talaj, nagy bűnyével becsült, könnyebb, kevesebb füvet ter-
mő erdőes legelő, - homokosabb földvegületedű, - közepes be-
csületű s 2. osztályú szántóföldnek becsülendő.

3. A Tóközi legelőnek azon része, mely a Kárpáti erdő
delétől, az n. n. Harmoshatár, remes földet és Solastói dűlő
között, egész a kecskeudvarig keletreigen elnyúlik, - ritka ha-
lozatú sovány füvet termő gyepesedő, s mint ilyen rosz:
a közben kecskére nyuló több rendű virallásot miatt szán-
tós földvé épen nem kelendő. - A Tóközi legelőnek to-
bbi része pedig egész hitejedésében róma földesű, ritka,
de kevesebb füvet termő halozatú gyepesedő, s mint il-
lyen a közép, - termő homokos földvegületedű fogva pe-
dig szántóföldnek a 2. osztályú sorozható.

4. A Kárpáti alsó erdőnek n. n. Parlova homok, vagy is a
Salamánból ezen erdőre vezetű ud épkánygöti része egész
a Pitvas belső Malomig dombos földesű, sovány füvet ter-
mő, igen ritka halozatú széles gyepesedő: földvége ke-
mésletlen

2

termékellen (sárga) homok (lévén), rosz legelőnek, s 3. osztályú
szántóföldnek becsültek.

5. Azan az alsó erdőnek azon része, mely a St. Kuthol' a sa-
lamosi határ köztében, s felől a Csiki határig, lefelől
az n. n. keskeny lániaig, s felől pedig a Felényesi gólyáig ter-
jed, - Tölgy, Nyírfa és apró tölgyvel benőtt, sötét, tömött, ha-
lórakú fűvel termő erdő legelő: földrajzileg kevesebb termé-
keny rona homok, mint legelő köze, mind szántóföld 2. osztályú-
ba sorozatik.

6. A Felényesi vágás, - nevezetesen a keskeny és Nagy
lánia (sötét fűvel) legintebb gólyáig, s kevesebb tölgyfa-
val, de sűrűn benőtt, a fát arnya miatt igen keves fűvel
termő erdő rona legelő: kevés kavicsot vegyűlt bombos föld-
vegyületű, - rosz legelőnek s 2. osztályú szántóföld becsültek.

7. A St. Kuth vágás a Ganna lánia felől kezdve a Pörös fo-
lyóig, sűrű gólyáig s a fát arnya miatt fűvel igen
gyérűn benőtt rona erdő legelő: talaja kevesebb termékeny
homok, mint legelő rosnak, mind szántóföld 2. osztályú-
ba becsültek.

8. A Pörös folyótól kezdve a Bereckajai szántó erdőig
vonalig vegyes fákkal és tölgyvel benőtt, tömött, ha-
lórakú fűvel termő erdő rona legelő: kevesebb ter-
mékeny homokkal keverve kavics föld vegyűlt (lévén), mind
legelő köze, mind szántóföld 2. osztályú sorozatik.

9. Bereckajai szántó erdő, a Paplova-homokjától a keskeny
lániaig, tölgy, gyil, kevés cserfával és tölgyvel benőtt rona
fűvel, - sötét és ritkább halórakú fűvel termő erdő
legelő; - talaja kevesebb termékeny homokkal vegyűlt kavics,
s a közepes legelőnek s 2. osztályú szántóföldnek be-
csültek.

10. Pélőhomok, rona fűvel, fa és tölgyvel tömött, tö-
mött halórakú fűvel termő gólylegelő: kevesebb
termő homok